



تداوی هپاتیت بی و هپاتیت سی

اگر شما به هپاتیت بی یا هپاتیت سی تشخیص شده اید ، اینها مواردی اند که باید بدانید:

برای هپاتیت بی:

- متأسفانه در حال حاضر برای هپاتیت بی علاج وجود ندارد اما تداوی موثر برایش موجود است.
- همه افراد مبتلا به عفونت هپاتیت بی به تداوی نیاز ندارند اما همه این اشخاص نیاز به معاینات منظم توسط دوکتور دارند.
- تداوی آن توسط متخصص جگر یا امراض ساری یا دوکتور عمومی که آموزش تخصصی برای تجویز دواها را انجام داده است ، تجویز می شود. برای مشاهده لیستی از دوکتوران عمومی که این تداوی را تجویز میتوانند به آدرس ashm.org.au/PrescriberListing مراجعه کنید.
- اگر دواهای هپاتیت بی برای شما تجویز شده است ، باید تا آخر عمر آن را مصرف کنید.
- دواهای هپاتیت بی تعداد ویروس های این مرض را در خون شما کاهش می دهد که به پایین آمدن خطر مبتلا شدن به آسیب جگر و سرطان جگر کمک می کند.
- دو تداوی اصلی که در حال حاضر در استرالیا موجود است عبارتند از Entecavir و Tenofovir (انتاکاویر و تنوفوویر). دوکتور شما بر اساس ارزیابی کامل صحت شما مناسب ترین راه را با شما در میان می گذارد.
- هر شخصی که معمولاً دواي نام تجاری "Baraclude (entecavir)" مصرف می کند ، باید بداند که در حال حاضر همین دوا (زیر این نام تجاری) در طرح مزایای دواي استرالیا موجود نیست.
- دواهای مارک عمومی (جنریک) که عین همان اثربخشی را دارند به شما داده می شوند.



Hepatitis C



برای هپاتیت سی :

- هر فردی که در استرالیا با هپاتیت سی تشخیص شده است باید بداند که این مرض قابل علاج است.
- این دواها از طرف دولت استرالیا برای دارندگان کارت مدیکر با تخفیف (سب سایدی) به یک نرخ بسیار نازل فراهم می شود.
- کسانی که کارت مدیکر ندارند می توانند با نسخه به صورت آنلاین www.fixhepc.com.au به تداوی دسترسی پیدا کنند.
- همه دوکتوران عمومی می توانند دواي هپاتیت سی را تجویز کنند.
- دو دواي اصلی موجود در حال حاضر عبارتند از Entecavir و Tenofovir (انتاکاویر و تنوفوویر).
- این دواها بسیار موثر هستند و دواي تداوی به مدت ۸ یا ۱۲ هفته است. دواهاي تجویز شده بستگی به ارزیابی صحت فردی شما توسط دوکتور دارد.
- ممکن است لازم باشد برخی از افراد به متخصص جگر یا امراض ساری فرستاده شوند - در صورت لزوم دوکتور عمومی به شما اطلاع می دهد.
- ۳ ماه پس از تکمیل شدن تداوی به معاینه خون نیاز دارید تا بتوانید بفهمید که آیا بهبود یافته اید یا خیر.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی در مورد دواهايی که مصرف می کنید ، باید با دوکتور خود مشورت کنید.

اگر تا به حال معاینه هپاتیت بی یا سی را انجام نداده اید یا اینکه نمی دانید که این معاینه برای تان اجرا شده است ، باید از دوکتور خود معاینه خون خاص هپاتیت بی یا هپاتیت سی را تقاضا کنید تا بررسی شود. افراد زیادی در استرالیا زندگی می کنند که ممکن مرض را داشته و بدون علائم باشند و ممکن است در معرض آسیب جگر ، سرطان جگر و حتی مرگ باشند که با مدیریت و تداوی مناسب می توان از آنها جلوگیری کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هپاتیت بی یا سی می توانید به وب سایت ما www.eccq.com.au/bbv مراجعه کنید یا با اقبال پاکزاد، نیلی، تم، جون و غیره کارمندان صحتی ما تماس بگیرید.

