
چگونه دوای هپاتیت B (زردی سیاه) را در استرالیا مصرف کنیم

How to Take Hepatitis B Medication in Australia



| نام داکتر/ پرستار شما: |
|-------------------------|
| نام کلینیک شما: |
| شماره تلفون كلينيك شما: |

با ما تماس بگیرید

برای گرفتن معلومات بیشتر شما می توانید با برنامه صحی عشق (Love Health) – هپاتیتیس، ایچ، آی وی / ایدز و پروگرام صحت جنسی در شورای جوامع قومی کوئینزلند (ECCQ) تماس بگیرید.

تلفون: 3844 9166

ایمیل: health@eccq.com.au سسایت: www.eccq.com.au/bbv

این منبع معلوماتی توسط ECCQ با کمک مالی وزارت صحت کرینزلند با همکاری شفاخانه لوگان، شفاخانه روبال بر بزبن و زنان، ماتر، شفاخانه های پرنسس الکساندر ا، QuIHN و GESA بهده است.

محتویات این ورقهٔ معلوماتی، معلومات عمومی است. داکتر شماهدایات خاصی را در ارتباط با وضعیت صحی شما توصیه می کند. منتشر شده در اپریل 2024

| Your Doctor/Nurses Name: | |
|--------------------------|--|
| Your Clinic Name: | |
| Clinic Phone Number: | |

Contact Us

For more information you can contact Love Health – Hepatitis, HIV/AIDS and Sexual Health Program at the Ethnic Communities Council of Queensland (ECCQ)

Phone: **3844 9166**Email: health@eccq.com.au
Website: www.eccq.com.au/bbv





This resource is produced by ECCQ with funding from Queensland Health in collaboration with Logan, Royal Brisbane and Women's, Mater, Princess Alexandra Hospitals. QuIHN and GESA

The information in this factsheet is general in nature.

Your health practitioner will advise specific instructions relevant to your individual health requirements. Published April 2024

- Have your regular tests including blood tests and ultrasounds as ordered by your doctor or nurse.
- Let your doctor know before taking herbal or traditional medicines or any other medicines. They may affect your hepatitis B medication.

Tips for taking the medication:

- Set an alarm on your phone to remind you to take your medication at the same time every day.
- Talk to your pharmacist about a Webster-pak (a pre-arranged medication container) if you take other medications at different times.
- Ask your pharmacist to keep your prescription and remind you when it is due for refill (get more).
- Doctors, nurses, or pharmacists can access free interpreter services if you need help with language.
- Do not have a Medicare Card? You can access medicines online from overseas.

- آزمایشات منظم خود از جمله آزمایش خون و سونوگرافی را طبق دستور داکتر یا پرستار تان انجام دهید.
- قبل از مصرف دو اهای گیاهی یا سنتی یا هر دو ای دیگر
 به داکتر خود اطلاع دهید. اینها ممکنست بر دو اهای
 هپاتیت B (زردی نوع سیاه) شما تأثیر داشته باشند.

نکاتی در مورد مصرف دوا:

- زنگ هشدار را در تلفون خود تنظیم کنید تا به شما یادآوری کند که دوای خود را هر روز در یک وقت معین مصرف کنید.
- اگر دواهای دیگری را در زمان های مختلف مصرف می کنید، با دواساز خود در مورد یک Webster-pak (یک جعبهٔ دوای از پیش ترتیب داده شده) صحبت کنید.
- از دواساز خود بخواهید که نسخه شما را در دواخانه خود نگه دارد و به شما یادآوری کند که چه زمانی باید دوباره گرفته شود (دوای بیشتربگیرید).
- در صورت نیاز به کمک در زبان، داکتران، پرستاران یا دواسازان می توانند به خدمات ترجمانی رایگان دسترسی داشته باشند.
- آیا کارت مدیکر ندارید؟ می توانید از خارج از کشور
 به صورت آنلاین به دواها دسترسی داشته باشید.



Entecavir:

- Sometimes called by its current brand names Apotex or Mylan.
- Must have a valid doctor or nurse practitioner prescription to buy at a pharmacy.
- Take one tablet once a day with water your doctor will let you know if you need a different dose.
- You need to take this medication on an empty stomach – do not eat for 2 hours before and 2 hours after taking the medication.
- Some people find it easier to take the tablet first thing in the morning, and then eat breakfast 2 hours later; or take it before going to bed at night (do not eat for 2 hours before).
- Available at a lower cost with a Medicare Card or Concession Card such as Health Care Card.
- Available on a private prescription (full price) if you do not have a Medicare Card. Please discuss costs with your doctor or pharmacist.

Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF):

- Sometimes called by its current brand name Viread.
- Must have a valid doctor or nurse practitioner prescription to buy at a pharmacy.
- One tablet once a day with water your doctor will let you know if you need a different dose.
- · Can be taken with food.
- Safe to use in pregnancy.
- Available at a lower cost with a Medicare Card or Concession Card such as Health Care Card.

 Available on a private prescription (full price) if you do not have a Medicare Card. Please discuss costs with your doctor or pharmacist.



انتكاوير(Entecavir)

- بعضی اوقات با نام های تجاری فعلی اش Apotex یا میلان Mylan نامیده می شود.
- باید از یک داکتر یا پرستار رسمی نسخه داشته باشید تا بتوانید آن را از دو اخانه بخرید.
- روزانه یکبار یک تابلیت را با آب بخورید در صورت نیاز به دوز متفاوت، داکتر تان به شما اطلاع خواهد داد.
- باید این دوا را با معدهٔ خالی بخورید 2 ساعت قبل و 2 ساعت بعد از گرفتن این دوا غذا نخورید
- برای بعضی افراد آسانتر است که اول صبح این تابلیت را بخورند و
 2 ساعت بعد ناشتا بخورند. یا شب ها قبل از خواب بخورید
 (2 ساعت قبل از آن غذا نخورید).
- با کارت مدیکر یا کارت تخفیف مانند هلتکر کارت به قیمت کمتر در دسترس است.
- اگر کارت مدیکر ندارید، با نسخه خصوصی (قیمت کامل) در دستر س است. لطفاً در مورد قیمت این دوا با داکتر یا دواساز خود صحبت کنید.

تنوفوویر دیزوپروکسیل فومارات (TDF): Tenofovir Disoproxil Fumarate:

- گاهی اوقات با نام تجاری فعلی آن Viread یاد می شود.
- باید از یک داکتر یا پرستار رسمی نسخه داشته باشید تا بتوانید آن را از دواخانه بخرید.
- یک تابلیت یکبار در روز همراه با آب اگر به دوز متفاوتی نیاز
 دارید، داکتر به شما اطلاع خواهد داد.
 - مى توان با غذا مصرف كرد.
 - استفاده از آن در حاملگی بی خطر است.
- با کارت مدیکر یا کارت تخفیف مانند هلتکر کارت به قیمت کمتر در دسترس است.
- اگر کارت مدیکر ندارید، با نسخه خصوصی (قیمت کامل) در دسترس است. لطفاً در مورد قیمت این دوا با داکتر یا دواساز خود صحبت کنید.



Tenofovir Alafenamide (TAF):

- Also called by its current brand name Vemlidy.
- Must have a valid doctor prescription.
- One tablet once a day with water your doctor will let you know if you need a different dose.
- Can be taken with food.
- Not currently available at a lower cost in Australia even if you have a Medicare Card or Concession Card such as Health Care Card, therefore, you will pay full price. Talk to your doctor or pharmacist about the cost – may also be available online for purchase from overseas.

Important things to remember:

- These medications are generally for life-long term use, like for other chronic health conditions.
- Take one tablet every day at the same time with water.
- Missed a tablet? Take the missed tablet as soon as possible when you remember if it is the same day. Then, take your normal tablet the next day.
- Do not take 2 doses at one time or on the same day.
- Do not share your medication with other people, such as your family members or friends.
- These medications have very few side effects. Some people may experience mild headaches, nausea, tiredness etc., when starting the medication. If you have symptoms that worry you, do not stop taking the medications without first talking to your doctor or nurse.
- Make sure you do not run out of medications; stopping and starting medications can cause serious problems for your liver and health. If you do run out of medications contact your doctor or nurse immediately.
- Do not stop medications whilst fasting e.g., during Ramadan or if taking other medications such as antibiotics etc. If you are unsure, ask your doctor, nurse, or pharmacist.
- Discuss with your doctor before you travel as you will need sufficient medications whilst away. You may need a letter from your doctor to carry the medications into another country.

تنوفووير آلافناميد (Tenofovir(TAF) عنوفووير آلافناميد

- با نام تجاری فعلی آن Vemlidy نیز یاد می شود.
 - باید نسخه داکتر رسمی داشته باشید.
- یک تابلیت یکبار در روز همراه با آب اگر به دوز متفاوتی نیاز دارید، داکتر به شما اطلاع خواهد داد.
 - مي توان با غذا مصرف كرد.
- در حال حاضر به قیمت کمتر در استرالیا در دسترس نیست، حتی اگر کارت مدیکر یا کارت تخفیف مانند کارت مراقبت صحی هم داشته باشید، بنابراین، قیمت کامل را پرداخت خواهید کرد. در مورد قیمت آن با داکتر یا دواساز خود صحبت کنید ممکن است از خارج از کشور به صورت آنلاین برای خرید نیز در دسترس باشد.

نکات مهمی که باید به خاطر بسیارید:

- این دواها عموماً برای استفاده در تمام دوران عمر است همانطوری که در سایر امراض صحی مزمن معمول است.
 - هر روز یک تابلیت و در عین وقت با آب خورده شود.
- آیا مصرف یک تابلیت را فراموش کرده اید؟ اگر در عین روز به یاد تان آمد که تابلیت تانرا فراموش کرده اید، می توانید آن را همان روز بخورید. سپس، تابلیت معمولی خود را روز بعد بخورید.
 - 2 دوز دوا را در یک وقت یا در یک روز نخورید.
- دواهای خود را با افراد دیگر، مانند اعضای خانواده یا دوستان خود به اشتراک نگذارید.
- این دواها عوارض جانبی بسیار کمی دارند. بعضی از افراد ممکن است در هنگام شروع دوا سردردهای خفیف، حالت دلبدی، خستگی و غیره را تجربه کنند. اگر علائمی دارید که شما را نگران می کند، بدون مشورت با داکتر یا پرستارتان، مصرف دواها را قطع نکنید.
- مطمئن شوید که بدون دوا نمانید. قطع و شروع دواها می تواند مشکلات جدی برای جگر و صحت شما ایجاد کند. اگر دوای شما تمام شد، فوراً با داکتر یا پرستار خود تماس بگیرید.
- دواها را هنگام روزه داری، مثلاً در ماه رمضان یا در صورت مصرف سایر دواها مانند انتی بیوتیک ها و غیره قطع نکنید. اگر مطمئن نیستید، از داکتر، پرستار یا دواساز تان سوال کنید.
- قبل از سفر با داکتر خود صحبت کنید زیرا در طول سفر به دواهای کافی ضرورت خواهید داشت. ممکن است برای بردن دواها با خود به کشور دیگر به نامهٔ داکتر تان ضرورت داشته باشید.